



A través de sus diversos programas de estudios, la Red de Educación e Investigación de las Enfermedades Hepáticas en la niñez, se esfuerza por proporcionar información y apoyo a los individuos y familias afectadas por estas enfermedades.

HEPATITIS NEONATAL IDIOPÁTICA

¿Qué es la Hepatitis Neonatal Idiopática?

La Hepatitis Neonatal Idiopática (INH) es un término general para la inflamación del hígado que ocurre inmediatamente después del nacimiento en recién nacidos (menos de 3 meses de edad) para lo cual no se ha identificado una causa específica. La hepatitis neonatal puede ser causada por una de múltiples causas, incluyendo causas metabólicas, infecciosas y genéticas. Las enfermedades metabólicas incluyen deficiencia de anti tripsina alfa A1, fibrosis quística, enfermedad neonatal de almacenamiento de hierro, defectos de la cadena respiratoria y defectos de la oxidación del ácido graso. Causas infecciosas incluyen sífilis congénita, ecovirus, y algunos virus herpéticos. Los clásicos virus de hepatitis (A, B, y C) son la causa menos común. También hay un número menos común de defectos genéticos, tal como el síndrome Alagille y la progresiva colestasis intrahepática familiar. En la Hepatitis Neonatal Idiopática, la causa de la inflamación permanece desconocida.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de la hepatitis neonatal idiopática pueden variar enormemente de un individuo a otro. Los infantes con hepatitis neonatal idiopática, pueden tener ictericia como el único síntoma; usualmente en las primeras dos semanas de vida, desarrollándose hasta el tercer mes de vida. También puede haber orina oscura, hepatomegalia y deposiciones acolicas. Otros síntomas pueden incluir retraso en el crecimiento, irritabilidad y prurito (comezón).

¿Cómo se diagnostica?

El mayor desafío en diagnosticar hepatitis neonatal idiopática, es su diferenciación de otras enfermedades hepáticas neonatales con causas conocidas. La hepatitis neonatal idiopática es diagnosticada una vez que se han completado las pruebas para determinar otras causas metabólicas, infecciosas y genéticas. Esto se hace a través de pruebas de sangre, escáner hepatobiliares, posibles pruebas genéticas o metabólicas, o biopsia hepática. En la biopsia, los hepatocitos están agrandados y no se encuentra la causa.

¿Cómo es tratada?

Puesto que no hay una causa conocida para la hepatitis neonatal idiopática, el



tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y buen soporte nutricional. Esto incluye medicamentos para estimular el flujo de la bilis, formulas pre digeridas y extra cantidad de vitaminas A, D, E, y K.

¿Cuál es el pronóstico de los infantes diagnosticado con hepatitis neonatal idiopática?

Aproximadamente 80% de los infantes diagnosticados con hepatitis neonatal idiopática se recuperan completamente de la condición. Con el pasar de los años, a medida que causas más específicas de este síndrome sean diagnosticadas, el número de infantes diagnosticados colestaticos, disminuye. En el futuro se espera que este número continuara disminuyendo a medida que se describan causas más específicas.